

## 「經濟栽培種」、「芭蕉種」及「觀賞蕉種」品種介紹

一、經濟栽培種：有「北蕉」、「台蕉二號」、「寶島蕉」(AAA)、「台蕉5號」(AAA)、「台蕉6號」(AAA)等5個品種，各品種之生育特性如下列：

「北蕉」(AAA)：

「北蕉」為台灣傳統優良栽培種，栽種已有250年歷史，分佈全省各重要蕉區。「北蕉」屬華蕉亞群(Cavendish subgroup)，為全球蕉質主要種類，亦為本省最重要的內外銷品種。1.植株高大而粗壯，新植株高約為270~300公分。2.雄花苞紫紅色，部分苞片殘留在花軸上。3.果房碩大，每株果重約20~30公斤。4.果指形狀略呈弓形，熟後果皮呈金黃色，肉淡黃色，細緻香甜，風味品質極佳，尤以三至六月最為優良。5.「北蕉」生長發育迅速，新植後約十二個月可採收。

「北蕉」適應性廣，唯植株高大、易受風害。對黃葉病第四生理小種不具抗性，不宜在黃葉病病園種植。



北蕉植株及黃熟果把

「台蕉二號」(AAA)：

於六十六年自巴貝多引進，原名不詳，以Cavendish B.F.稱之。在八十二年命名推廣。

- 1.屬中矮型，株高約230~260公分，假莖粗壯，較耐風。
- 2.葉片稍短而寬，葉型比為2.17至2.29。葉片較闊大而稠密。

- 3.雄花苞片全部殘留在花軸上。
- 4.果實外型、果重及後熟品質與「北蕉」相似。
- 5.對黃葉病不具抗性，不宜在病園種植。



台蕉二號植株及黃熟果把

「寶島蕉」(AAA):

又稱新北蕉，2001年選育兼具抗黃葉病和豐產特性品種；植株高度約280公分，每株果重約25~45公斤；果實風味與北蕉相似，略帶粉質，以5~6月口感最佳，生育期十三個半月，宜提早種植。並需及時防治抽穗期花薊馬侵入花苞之危害，避免果房發生水銹斑，影響果品商品價值。



寶島蕉植株及黃熟果把

#### 「台蕉5號」(AAA)

親本為「台蕉三號」，來源株系為「北蕉」。本種於民國96年10月申請抗病優良新品種命名，經審查通過命名為「台蕉5號」，中文俗稱為「玉山」。

1. 新植植株，株高約250~280 cm (平均269 cm)，假莖莖周69~72cm。
2. 葉片呈橢圓形，長201.6 cm，寬87.5 cm，葉形比為2.3，抽穗期葉片伸展正常。
3. 高屏地區自種植至採收日數約11~12個月。
4. 果房呈圓柱形、果手數及果指形狀具「北蕉」特性，大小適中，符合內外銷標準。
5. 對香蕉黃葉病具中抗性，在排水不良、砂質土壤及過量或不當噴施殺草劑之蕉園，蕉株發育較差，抗病力亦有降低的情況。蕉區與水稻等水生作物輪作或浸水二至三年，可有效降低黃葉病之發生。
6. 受花薊馬危害而產生果實水銹的情況輕微。



台蕉 5 號植株及黃熟果把

「台蕉 6 號」(AAA):

親本「台蕉二號」(Cavendish B.F)，與「北蕉」同屬華蕉系。本種於民國 96 年 10 月申請豐產優良新品種命名，經審查通過命名為「台蕉 6 號」，中文俗稱為「玉豐」。

1. 植株中矮型、粗壯。新植植株株高為 249~271cm (平均 267.5 cm)；假莖莖周 71~89cm，宿根為 78~100 cm。
2. 具豐產特性。每串果房果手數達 10~13 把；果指數 166~211；單株果重 27~35 kg，平均 31 kg；平均果指長約 23~24 cm；平均果指重約 155~200g。
3. 生育周期：本品種生育周期比「北蕉」約多 30 天。催熟後，轉色天數及櫛架壽命均為 4.5 天左右。
4. 蕉園選擇：不抗黃葉病，不宜在病園種植，可在新地或經與水稻等水生作物或輪作或浸水二年至三年的田間種植；或台糖砂礫地排水良好，亦可考量種植。



二、芭蕉種：有「旦蕉」、「玫瑰蕉」、「紅皮蕉」、「呂宋蕉」、「假呂宋蕉」、「南華蕉」等 5 個品種，各品種之生育特性如下列：

「旦蕉」(AA)：

原名：Kluai Khai (泰)

別名：Pisang Mas (馬)，Amas (菲)，Sucrier (澳)，貢蕉 (越)

旦蕉的泰國原名為 Kluai Khai，Khai 意為「蛋」。是泰國及馬來西亞最重要的鮮食蕉品種。植株主要特徵為假莖青綠色，有明顯棕色斑塊，葉柄光滑不具腊質。旦蕉果房產量中等，單株果重約 7~13 公斤，6~7 果把。果指短圓，未熟時青綠色，熟後呈淺黃色，皮極薄，肉質滑，甜度高，橙黃色，微帶香氣。

本種對黃葉病第一生理小種可能具抗性，但不抗第四生理小種。種植時要注意防治果蠅及花薊馬，以免果房受損。目前，旦蕉在本省種植極少。據市場試銷初步調查，反應良好，受消費者歡迎。



旦蕉植株及黃熟果把

「玫瑰蕉」(AA)：

原名：Cultivar Rose

本種乃於 1995 年從比利時國際香蕉種原轉運中心引進，原名 Cultivar Rose，意譯為玫瑰蕉。其果指纖細，肉甜而香，具香蕉風味。玫瑰蕉為兩倍體(AA)，來源不詳，可能是印度尼西亞的一個地方品種。植株屬中高，假莖較細小，綠中帶紅，表面光滑，葉片窄長。

根據初步觀察，本種生育週期短，約 9~10 個月可採收。其果房產量屬中等，約 5~12 公斤。在冬春季節，產量較低，在夏秋季節則較高。果指細長而尖，催熟後呈鮮黃色。果肉淺黃色，香甜，口感極佳。

本種對黃葉病具高度抗性，可在病區種植。具發展為高品質精緻水果的潛力。



玫瑰蕉植株及黃熟果把

「紅皮蕉」(AAA)：

別名：Morado (菲、中南美)，Pisang Raja Udang (馬)，Kluai Nak (泰)，Red Dacca (澳)，Rouge (非洲)，蘋果蕉

紅皮蕉因果皮呈暗紅色而得名。本種遍佈全球蕉區，在東南亞及中南美洲均普遍種植，但多為庭園式栽培，少有大量種植。本省在旗山、埔里、集集、花蓮等地也有少量栽培。

紅皮蕉植株高大，生育期長，達 18 個月。假莖呈深紅色，產量中等，平地約 12~15 公斤。果指屬中型大小，肥短而直，果肉呈黃白色，味甜而香，肉質較軟，口感不及一般香蕉。

本種常有體細胞變異發生，假莖及果實會變為綠色，稱為青皮蕉。在本省中部曾發現紅綠各半的果房。



紅皮蕉植株及黃熟果把

「呂宋蕉」(AAA)：

別名：Latundan (菲)，Raja Sereh (印尼)，Pisang Rastali (馬)，Rasthali (印度)，Sugar (澳)，Manzana(西印度群島)，Maca (巴西)，日本蕉，南洋蕉，粉蕉

呂宋蕉係由菲律賓引進，原產地可能是印度，在巴西大量種植，是重要水果之一。本省在南部左鎮、恆春地區栽培較多。

本種株高中等，葉柄較細長，葉片呈窄長型，產量中等，約 12~15 公斤。果指短小，未熟時青綠色，熟後呈深黃色，有細小褐色條紋。皮薄易裂，果梗較弱，果指易脫落。果肉黃白色，甜中帶酸，微有香氣，口感極佳。食用時宜等果肉

變軟，過早有澀味。此外在四、五月間採收，果實常有硬塊出現，宜避免採收。



呂宋蕉植株及黃熟果把

「假呂宋蕉」(AAB)：

因呂宋蕉易感黃葉病，在左鎮地區，許多農民已改種與呂宋蕉相似的假呂宋，具抗病性。屬印度種 Mysore。假呂宋植株較粗壯，葉中肋紫紅色為其特徵。其產量較高，達 20~25 公斤。果指中型，前端呈乳頭狀突起，果皮鮮黃，耐貯運，味甜而酸，肉質較軟，口感不及呂宋蕉。



假呂宋蕉植株及黃熟果把

「南華蕉」(ABB)：

原名：Kluai Namwa (泰)

別名：Katali (菲)，Pisang Awak (馬)，Daccasse (澳)，芭蕉

南華蕉是泰國著名煮食及鮮食兩用蕉，在馬來西亞亦普遍種植。在本省南投縣的埔里、集集山區栽培較多。一般稱為芭蕉。

本種植株粗壯高大，適應性強，耐旱抗病，極易栽培。其假莖呈青綠色，有明顯腊質，少有黑色斑塊。葉柄邊緣內彎密封。



南華蕉果房較大，單株果重較高，約 20~28 公斤。果手排列整齊，果梗較長。果指中型大小，呈粗短狀，稜角明顯。果皮呈灰綠色，熟後呈淡黃色，經擦壓後，容易變黑。肉白質粘，清甜可口，惜無香味。宜等果肉變軟時食用，否則有澀味。

本種在泰國除鮮食外，更用作煮食。把果肉切塊串燒，再加蜂蜜，或切片沾麵粉油炸，風味均佳。其雄花苞亦可煮食。



南華蕉植株及黃熟果把

三、觀賞蕉種：有「紫夢幻蕉」、「腊紅夢幻蕉」、「橘紅夢幻蕉」、「紅蕉」、「紫蕉」、「斑葉蕉」、「地涌金蓮」及千層蕉等 8 個品種，各品種之簡介如下列：

「紫夢幻蕉」：*(Musa ornata)*

分佈於印度、緬甸、泰國，是最普遍的芭蕉屬觀花品種。植株粗壯，叢生，達 2~3 公尺以上。苞片外面為紫色，背面為淡紫色。雄花為深黃色，花形漂亮。花序及果串皆為直立，頗適合作插花材料。在庭園種植生長快速，花苞艷麗，可用作盆栽，植株達 1 至 1.5 公尺即可開花。



紫夢幻蕉

「腊紅夢幻蕉」: (*Musa laterita*)

原產印度、緬甸、泰國。其名 *laterita* 源自 laterite 磚紅色之意。該品種外形酷似紫夢幻蕉，但植株較纖細，株高 1 至 2 公尺，非叢生，有地下葡萄莖。盛花期在夏天，不耐寒。苞片為橘紅色，苞端呈淺黃色，雄花則為深黃色。花苞鮮艷奪目，是切花、插花的好材料。本品種植株較矮，非常適合作為盆栽。利用矮化劑植株在盆栽達 0.5 至 1 公尺即可開花。



腊紅夢幻蕉

「橘紅夢幻蕉」：*(Musa beccarii)*

原產印尼。植株粗壯，叢生，株高可達 2 公尺。花苞鮮紅色帶腊質的光彩，苞端淺綠，極為鮮艷奪目，可作切花或插花造型用。除可在庭園觀賞外，亦適合作盆栽，植株達 1 公尺即可開花。



橘紅夢幻蕉

「紅蕉」：*(Musa coccinea)*

又名美人芭蕉、觀賞芭蕉。原產於越南。株高達 1.5 至 2 公尺，葉片細長呈淺綠色。花期夏至秋季，花苞鮮紅，苞端微黃，甚為美艷。除供庭園種植及盆栽觀賞外，由於花莖長，花期長而苞片顏色鮮麗，是切花、插花的上等花材。



紅蕉

「紫蕉」：*(Musa valutina)*

原產印度北部。其名 *valutina* 源自果房絲絨般的絨毛。植株矮小，可達 1 至 1.5 公尺。花苞紫紅色，雄花為橘黃色。果指成熟時表面有細毛，果皮呈紫紅色，果形短肥可愛。果指成熟後自然裂開，露出雪白的果肉，內包黑色的種子。除可作庭院栽種外，適合為觀花及觀果的盆栽。



紫蕉

「斑葉蕉」：*(Musa acuminata spp zebrina)*

原產印尼。植株高而纖細，外形類似食用香蕉，高達 3 公尺。其特色在於葉片上褐色之大斑點，及葉背呈古銅色。除庭院種植外，盆栽利用矮化劑控制株高，可使葉片更寬，斑點顏色更深，是頗受喜愛的觀葉盆栽。



斑葉蕉

「地涌金蓮」：(*Musa lasiocarpa*)

又名千瓣蓮花。原產雲南，高海拔 2500 公尺，耐寒。植株矮小(1 公尺上下)，叢生。假莖由葉鞘層層重疊，葉片綠色，形似芭蕉。苞片金黃色，形如花瓣，由下而上逐漸展開，保持長時間不枯萎，恰如一朵盛開蓮花，花期長達 250 天。是不可多得的觀花品種。



地涌金蓮

「千層蕉」：(*Musa chilocarpa*)

原產馬來西亞。植株高大，外形像食用香蕉，可達 2 至 3 公尺以上。具特色是開花後果串繼續生長，直至貼近地面。其果指短小粗壯，果把排列緊密，故稱為千層蕉 (Seri 在馬來話是一千)。



千層蕉